

ПУБЛИЧНИ КОНТАКТИ				КОНТАКТИ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ		
	Тип контакт	Пример	Необходими мерки	Тип контакт	Пример	Необходими мерки
Контакт с висок риск	Живеещ в една жилище с, намиращ се в интимен контакт с или полагащ грижи в нелечебно заведение (напр. в дома) за човек със симптоматична, лабораторно-потвърдена COVID-19	Партньор, съпруг/съпруга, съквартирант, болногледач, тн.	Домашна карантина за 14 дни от последната експозиция; активно мониториране за симптоми за 14 дни от последната експозиция	Пребиваване в същото помещение или извършване на процедури, генериращи високи концентрации на секрети и аерозоли от дихателната система, без използване на всички препоръчителни СПП*, или близък контакт без използване на респираторни предпазни средства с пациент с лабораторно-потвърдена COVID-19, който не е носил маска	Здравен работник, който не е поставил всички препоръчителни СПП* и е участвал във вземане или е присъствал по време на вземане на назофарингеални или орофарингеални проби	Домашна карантина; отстраняване от работа; активно мониториране за симптоми за 14 дни от последната експозиция
Контакт със средно-висок към висок риск	Продължителен или чест контакт с човек със симптоматична, лабораторно-потвърдена COVID-19	Член на семейството, с който е осъществена продължителна среща или колега, с който е осъществен близък професионален контакт	Домашна карантина за 14 дни от последната експозиция Активно мониториране за симптоми за 14 дни от последната експозиция	Продължителен (15 минути или повече) контакт с пациент с лабораторно потвърдена COVID-19 или с негови секрети или екскрети, без използване на всички препоръчителни СПП*	Преглед на витални показатели и вземане на кръв на пациент с маска с използване на ръкавици и хирургична медицинска маска	Отстраняване от работа; активно мониториране за симптоми за 14 дни от последната експозиция
Контакт със средно-висок риск	Близък контакт с човек със симптоматична, лабораторно-потвърдена COVID-19, който не покрива дефиницията за контакт с висок и средно-висок към висок риск	Колега, с който не е осъществяван близък професионален контакт, но с който е осъществяван регулярен контакт лице-в-лице	Активно мониториране за симптоми за 14 дни от последната експозиция	Повече от кратък контакт (>1-2 мин) с пациент с лабораторно-потвърдена COVID-19 или негови секрети или екскрети, без използване на всички препоръчителни СПП*, който не покрива критериите за контакт с висок и със средно-висок към висок риск.	Преглед на пациент за 5 минути с използване на маска, защитен костюм, ръкавици и лицев щит (но не респиратор)	Отстраняване от работа; активно мониториране за симптоми за 14 дни от последната експозиция
Контакт с нисък риск	Пребиваване в едно и също помещение или в продължение на 2 часа с човек със симптоматична, лабораторно-потвърдена COVID-19	Пребиваване в една и съща болница или в една и съща болнична чакална, или в продължение	Активно мониториране за симптоми за 14 дни от последната експозиция	Контакт без значение от продължителността с пациент с лабораторно-потвърдена COVID-19 с използване на всички препоръчителни СПП*, кратък индиректен контакт с пациент (1-2 мин) без използване на всички	Преглед на пациент с ръкавици, защитен костюм, лицев щит или очила и подходящ, добре-поставен респиратор; влизане за кратко в стаята на пациента без директен контакт с него	Активно мониториране за симптоми за 14 дни от последната експозиция

		на 2 часа с доказан случай		препоръчителни СПП* или работа в същото време и на същото място, в които е имало потвърден случаи на COVID-19, но без категорично пребиваване в една стая	или негови секрети или екскрети	
Липса на контакт	Далечен контакт с човек със симптоматична, лабораторно-потвърдена COVID-19, който не покрива критериите за контакт с висок, средно-висок към висок, средно-висок и нисък риск	Разминаване с човек в коридора	Не са необходими	Контакт, който не покрива критериите за висок, средно-висок към висок, средно-висок и нисък контакт	Разминаване с пациент в коридора	Не са необходими
<p>COVID-19 – коронавирусна болест 2019; СПП – средства за персонално предпазване</p> <p>Близък контакт се дефинира като контакт от дистанция до 6 метра или в стая или зона, в която се обгрижва потвърден случай на COVID-19 (включително пребиваване в чакалня), или споделяне на пространство, в което е пребивавал потвърден случай на COVID-19 в рамките на последните 2 часа. Преходни взаимодействия като разминаване с потвърден случай на COVID-19 не се смятат за близък контакт. NB – събирането на проби от назофаринкса и орофаринкса не се смятат за аерозол-генериращи процедури, но се смятат за високо-рискова експозиция.</p> <p>*Препоръчителни СПП включват: предпазване на дихателните пътища (напр. респиратори); предпазни очила или лицев щит, които покриват предната и страничните части на лицето; ръкавици; защитен костюм</p>						

Табл. 1. Оценка на риска за инфектиране със SARS-CoV-19 при контактни лица

1. Isaac Ghinai, Tristan D McPherson, Jennifer C Hunter, et al. First known person-to-person transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in the USA. *Lancet*, 2020; *Lancet*. 2020 Mar 13. pii: S0140-6736(20)30607-3. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30607-3. [Epub ahead of print]
2. CDC. Interim U.S. guidance for risk assessment and public health management of healthcare personnel with potential exposure in a healthcare setting to patients with 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). Centers for Disease Control and Prevention, 2020. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-riskassessment-hcp.html> (accessed Feb 12, 2020).
3. CDC. Interim US guidance for risk assessment and public health management of persons with potential 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) exposure in travel-associated or community settings. Centers for Disease Control and Prevention, 2020. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html> (accessed Feb 12, 2020).